



## PERFIL DOS PORTADORES DE HEPATITES VIRAIS EM UM MUNICÍPIO DO BAIXO AMAZONAS

Sílvia Maria Farias Dos Santos e Heloisa Nascimento de Moura Meneses

**Introdução:** A hepatite viral é conhecida como uma doença infecciosa que afeta as células do fígado, tem como agente causador cinco tipos de vírus, são eles: hepatite A, hepatite B, hepatite C, Hepatite D e hepatite E. A forma de transmissão da hepatite pode ser tanto por via oral através de alimentos contaminados, como por outras vias: parenteral, sexual e contato direto, a depender do tipo de vírus. **Objetivo:** Caracterizar o perfil dos pacientes acometidos pelos vírus da hepatite no município de Santarém no período de 2015 a 2017. **Metodologia:** Trata-se de um estudo descritivo, de natureza quantitativa, na qual a coleta de dados foi realizada através do Sistema de Informação de Agravos de Notificação. Foi realizada uma análise descritiva das variáveis sexo, escolaridade, zona de residência, fonte de infecção e classificação etiológica. **Resultados e discussões:** No período estudado foram notificados 498 casos de hepatites no município de Santarém, segundo a classificação etiológica foram 168 (33,7%) vírus A; 175 (35,1%) vírus B; 149 (29,9%) vírus C; 1 (0,2%) vírus B e D; 2 (0,4%) vírus B e C. Quanto ao sexo observou-se que 275 (55,2%) dos casos notificados eram do sexo masculino e 223 (44,8%) do sexo feminino. A faixa etária mais frequente foi a de maiores de 15 anos com 74,8%. Quando analisado o grau de escolaridade foi observado que 18% dos casos notificados haviam cursado o ensino fundamental incompleto, 26,1% o ensino fundamental completo 25,9% o ensino médio incompleto/completo e 6% o ensino superior incompleto/completo. Em relação a zona de moradia constatou-se que 71,2% residia na zona urbana e 28,7% na zona rural. Quanto ao mecanismo de infecção 37,1% foi por via sexual e 33,3% através de alimentos/água. Dessa maneira, corroborando com a literatura, observou-se que no período estudado a hepatite A e B foram as mais frequentes entre os indivíduos residentes em Santarém. Vale ressaltar que a principal forma de contágio da hepatite B é através da relação sexual desprotegida, podendo ser transmitida de outra maneira, porém com menos frequência, já a hepatite A é transmitida através de água e alimentos contaminados. **Considerações finais:** É necessário que as campanhas contra as infecções pelos vírus da hepatite sejam intensificadas, juntamente com o diagnóstico precoce da doença, uma vez que segundo a literatura grande parte da população acometida pelo vírus B da hepatite cursa como assintomática, aumentando a cadeia de transmissão.